

## Liste des herbicides autorisés pour un usage « céréale de printemps » (source : ARVALIS)

CEREALES						HERBICIDES						
Hiver			Printemps									
Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Seigle	Triticale	Epeautre	Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	SPECIALITES COMMERCIALES	
<b>Anti-graminées</b>												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ATTRIBUT
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AXIAL Pratic / AXEO / ALKERA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BROCAR 240
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CELIO / DYVEL / PALOKY / SUPARAST
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CLODINASTAR / STIGMA / GRIMS / VELIOST
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FENOVA SUPER
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PUMAS
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TRAXOS Pratic / TROMBE / TOUNDRA
<b>Anti-graminées - anti-dicotylédones</b>												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ABAK / GUA SAR
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ARCHEPEL DUO / OLBLAK / AUZON DUO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO / ALTESSE PRO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AXIAL ONE / SWIPE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BATTLE DELTA / NAVIGATE / FUGA DELTA / NUCLEUS
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CARMINA MAX / STEEL
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CELYC
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CHLORTOLURON Nombreuses spécialités (2)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CODIX
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CONSTEL / LAUREAT
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	DAIKO / DATAMAR (1) (6)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	DEFIT / SPOW / MINARIX / REFITY / LINATI / MAJOR (1) (6)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	DEF Nombreuses spécialités (7)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FLIGHT
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FOSBURI / VALMAX / ANTILOPE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HUSSAR Pro (3)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GLOSET 600 SC / VULPIX 600 SC / HORDEO 600 SC / RODRIGO 600 SC
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GYGA / GARIO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KALENKO / BISCOTO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	JOYSTICK / KACIK
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LEVTO WG / COMPLISS WG / ENJEU / NIANTIC / ABSOLU / OBELISK (11)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	MATENO / PROCLUS / ANTILOPE TRIO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	MONOLITH
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OTHELLO / MEDZO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PACIFICA Xpert / BOGAGE Xpert / INIXIO Xpert
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PENDITEC 400 / FIBULE / PROTOE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PENTIUM FLO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PICO SOLO
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PONTOS
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PROWL 400 / BAROUD SC
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	QUINUS
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	REPLICA (10)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ROXY 800 EC / FIDOX 800 EC (1) (6)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SUNIRE / STRAFIRE / ENDERIX (9)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TRINITY (4)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TROOPER (5)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	VOLTAGE SC / SAITAN SC / DESTINY SC / BRAVADE SC
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	XINIA (8)

●	Produit autorisé sur la culture
○	Produit autorisé par porté de l'usage et avec l'accord de la firme
♦	Produit non autorisé

- (1) : L'utilisation de buses à injection d'air homologuées "réduction des Zones Non Traitées" est obligatoire.
- (2) : Pour les spécialités d'Adama, préconisées sur blé dur d'hiver, triticale et épeautre. Pour les spécialités de Nufarm, préconisées sur blé dur d'hiver, triticale et cultures de printemps.
- (3) : Traitement automne-hiver : 1 application tous les 3 ans (stade BBCH 13-19).
- (4) : Se référer aux indications d'ARVALIS et Adama pour la sensibilité des variétés de blé tendre.
- (5) : Pas d'application au stade pointant sur blé dur.
- (6) : Utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits.
- (7) : Pour Mamut/Mohican/Toiseau/Diflanil SD: utilisation possible sur blé tendre de printemps, blé dur de printemps et seigle de printemps à 0,375 l/ha.
- (8) : Suite à une utilisation sur céréales d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la métribuzine plus d'une année sur trois.
- (9) : Dose recommandée de 0,36 l/ha sur blé dur.
- (10) : Pour Replica seulement, pas d'utilisation sur épeautre.
- (11) : Pour Obelisk seulement, utilisation à 0,3 kg/ha sur cultures de printemps et 0,48 kg/ha sur cultures d'hiver.