

Tableau 1 : Liste des cultures de remplacement possibles après une céréale d'hiver désherbée à l'automne

Culture	Produit appliqué	Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Maïs	Lin	Colza	Pois protéagineux	Féverole	Tournesol	Betterave Sucrière	Pomme de Terre	Sorgho	Soja	Graminées fourragères	Légumineuses fourragères	Luzerne	Ray grass
		Avadex 480										-							
Chlortoluron	Application de CTU avant fin novembre																		
	Application de CTU en décembre/janvier																		
Codix*		-	-																
Constel / Lauréat	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
Défi/Daiko	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
DFF (nombreuses spécialités)	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
Fosburi *		(3m)	(3m)	(3m)		(5m)	(4m)		(4m)	-	(4.5m)		(4.5m)	(5m)					
Kalenkoa / Othello*	Application d'automne	(3m)	(3m)	(3m)		(5m)			(4m)	-				(5m)					
	Application de sortie d'hiver	-	-	-	-	(7.5j)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mateno *		(4m)	(4m)	(4m)	(4m)	(5m)	(5m)	-	(4m)	(4m)			(5m)	(5.5m)	(5.5m)				
Merkur *																			
Pontos *		(2m)	(2m)	(2m)	-	(2m)	-	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	-	-	-	-	-	-	-
Prowl 400 / Baroud SC																			
Quirinus *		(2m)	(2m)	(2m)	-	(2m)	-	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	-	-	-	-	-	-	-
Trinity*	Application avant fin novembre																		
	Application en décembre/janvier																		
Trooper *																			
Xinia *		(3m)	(3m)	(3m)	(4m)	(4m)	(4m)		(2m)	(4m)	(5m)	(5m)	(5m)	(5m)	(4m)			(4m)	(4m)

* données firmes

Légende :

	OK quel que soit le travail du sol
	Travail du sol nécessaire
	labour nécessaire
	déconseillé
(m ; j)	précision du nombre de mois ou jours entre l'application et le semis
-	pas de données